

SHERMAN OAKS COSMETIC AND IMPLANT DENTAL GROUP

CIRUGIA ORAL-INSTRUCCIONES POST OPERATORIAS

- Después de la cirugía, deberá tener un cojín de gasa doblado y colocado sobre el sitio de la extracción por un periodo no menos de 30 minutos, para poder morder. Al principio de este periodo, cambie la gasa cada cinco minutos. Después de un tiempo, usted cambiará la gasa solo en caso necesario.
- No se enjuague ni escupa durante las primeras 24 horas. Esto permitirá la formación de un coágulo sanguíneo apropiado. Lo cual es necesario en el proceso de curación.
- La presencia de un ligero escurrimiento de sangre es normal por uno o dos días después de la cirugía oral. Si la sangre mucha, por favor llame a nuestra oficina, para poder darle instrucciones.
- Limpie la sangre y saliva de sus labios usando un pañuelo desechable.
- Use una toalla vieja para cubrir la almohada durante la noche. Es probable que tenga un poco de sangre, lo cual es normal.
- Los pacientes con dentaduras postizas no deberán quitarse las dentaduras por lo menos en un periodo de 24 horas después de la cirugía. Después de este periodo, quítese las dentaduras y límpielas bien.
- Es aconsejable que alguien lleve al paciente de regreso a casa después de la cirugía oral. Esto permitirá que el/la paciente pueda recostarse o reclinarse en el carro, mientras es transportado(a) a casa.
- No deje solo al paciente en casa. Si el paciente es un niño, obsérvelo todo el tiempo hasta que se recupere; sus labios todavía estarán dormidos, cuide que no los muerda.
- El/La paciente no deberá fumar durante 48 horas después de la cirugía.
- El/La paciente no deberá beber con popote durante 48 horas después de la cirugía.
- Evite comidas y bebidas calientes durante las primeras 24 horas después de la cirugía.
- Los pacientes diabéticos deberán de mantener su dieta normal y tomar sus medicinas en forma usual.
- Si su dentista se lo recomienda, no se suene la nariz después de una extracción, por un periodo que le será designado.

MEDICAMENTOS

- Tome sus medicamentos tal y como se le indicó.
- Para adultos con dolor leve, tome una o dos aspirinas o Tylenol cada cuatro horas.
- Si desarrolla un salpullido (rash) en la piel, suspenda las medicinas.
- Si su médico le recetó codeína, tómela solo en caso de que la aspirina o el Tylenol no le quiten el dolor.
- No maneje ya sea un automóvil o maquinaria pesada al estar tomando codeína o cualquier otro medicamento para el dolor.
- No tome bebidas alcohólicas al estar tomando medicinas recetadas.

PARA LA INFLAMACIÓN

- Aplique una bolsa de hielo al área de la cara donde se le practicó la cirugía. Esto deberá ser realizado durante el tiempo que este despierto(a), en ciclos de 20 minutos de aplicación por 20 minutos de descanso y durante las primeras 24 horas después de la cirugía.
- El cepillado de los dientes es muy importante por lo que deberá iniciarse el día posterior de la cirugía.
- Usted podrá iniciar enjuagues muy suaves con agua tibia salada (una cucharada por vaso), el día posterior a la cirugía y repetir varias veces durante el día.

NO SE ENJUAGUE O ESCUPA EL DÍA DE LA CIRUGIA

ASISTA A LAS PROXIMAS CITAS. Aunque se este sintiendo bien, necesitamos estar seguros de que usted está sanando apropiadamente.